
Program monitoringu

Kategoria: Siedliska - metodyki badań
Opublikowano: środa, 26, Październik 2016 12:47
Super User

W ramach monitoringu siedliska Duża płytka zatoka (1160) badane są trzy komponenty środowiska biotycznego: makrozoobentos, makrofity oraz ichtiofauna. W zakresie badań makrozoobentosu określa się skład taksonomiczny, liczebność i biomasę, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania makrofitów obejmują: skład taksonomiczny i biomasę (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania ichtiologiczne wykonywane są włoczkiem dobrzeżnym w strefie brzegowej w obrębie siedliska. Ponadto, określony zostanie: (1) stopień antropogenizacji strefy brzegowej w granicach siedliska, (2) stopień porośnięcia szuwarem trzcinowym linii brzegowej w granicach siedliska oraz (3) stan piaszczystych łach występujących w obrębie siedliska.

Badaniami objęte jest Zatoka Pucka, jedyne w polskich obszarach morskich, stanowisko siedliska Duża płytka zatoka (1160) (rysunek).



Lokalizacja badanego stanowiska siedliska Duże płytkie zatoki (1160)

Metodyka padań siedliska Duża płytka zatoka (1160) dostępna jest po naciśnięciu

Phoca PDF

na poniższy link

Metodyka badań - Duża płytka zatoka (1160) pdf 1,4MB

Phoca PDF